

(参考)

改正後	現行
<p data-bbox="232 140 994 209">漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応 及び事業継続に関する基本的なガイドライン</p> <ul data-bbox="145 247 1120 933" style="list-style-type: none"><li data-bbox="145 247 1120 454">本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、漁業者（乗組員を含む。）に新型コロナウイルス感染症の患者が発生したときに、保健所（感染症担当。以下同じ。）等と連携して、感染拡大防止を前提として、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。<u>このガイドラインは令和2年5月8日の知見に基づいて作成されたもので、新たな知見により更新されます。</u><li data-bbox="145 470 1120 710">新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年4月1日現在、食品（生で喫食する鮮魚介類を含む。）を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません¹。<li data-bbox="145 726 1120 933"><u>なお、緊急事態宣言のもと、緊急事態措置を実施する特定都道府県では、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、業務を継続することとされています。漁業者においては、できる限り、後出の「三つの密」を避けるための必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続をお願いします。</u> <p data-bbox="120 970 730 1002">1. 新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底</p> <ul data-bbox="145 1013 1120 1364" style="list-style-type: none"><li data-bbox="145 1013 1120 1149"><u>新型コロナウイルス感染症については、感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされ、無症候の者からの感染の可能性も指摘されています。</u> <u>こうしたことから、人と人との距離をとること（Social distancing：社会的距離）により、大幅に感染リスクが下がるとされています。特に①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人々が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）という3つの条件（以下「三つの密」という。）のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。</u>	<p data-bbox="1270 140 2031 209">漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応 及び事業継続に関する基本的なガイドライン</p> <ul data-bbox="1176 247 2150 710" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1176 247 2150 383">本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、漁業者（乗組員を含む。）に新型コロナウイルス感染症の患者が発生したときに、保健所（感染症担当。以下同じ。）等と連携して、感染拡大防止を前提として、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。<li data-bbox="1176 470 2150 710">新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年2月21日現在、食品（生で喫食する鮮魚介類を含む。）を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません¹。 <p data-bbox="1176 726 1288 758"><u>(新設)</u></p> <p data-bbox="1151 970 1760 1002">1. 新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底</p> <ul data-bbox="1176 1013 2150 1149" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1176 1013 2150 1149"><u>新型コロナウイルス感染症対策については、現在、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター（集団）が次のクラスター（集団）を生み出すことを防止することが極めて重要な時期とされており、厚生労働省、都道府県、保健所からの情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。</u>

【参考】

- ・ 「新型コロナウイルス感染症対策の 基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- ・ 「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」(厚生労働省HP)
- ・ 「家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～」(厚生労働省HP)
- ・ 「人との接触を8割減らす、10のポイント」(厚生労働省HP)

- ・ 漁業者は、乗組員に対し、次に掲げる感染予防策を要請します。

①・② (略)

③ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに漁業者に連絡のうえ、保健所に問い合わせ

ア 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

イ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

〔※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方〕

ウ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合

症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

エ 妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。

- ・ また、漁業者は、例えば産地市場など常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には 2メートル(互いの手を伸ばしたら届く距離)を目安として適切な距離を保って取引を行うことを徹底するなど、感染予防策を行ってください。

マスクの確保については、供給が十分でない状況ですが、政府として取り組んでいるところであり、再利用可能な布製マスクの活用も含め、御理解をいただきますようお願いいたします。

- ・ 事務所や船内においても、できる限り、換気、人と人との間隔を適切にとること等に注意するなど、「三つの密」を避けるための所要の感染防止対策をとってください。

【参考】

- ・ 「新型コロナウイルス感染症対策の 基本方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- ・ 「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」(厚生労働省HP)
- ・ 「家庭内でご注意いただきたいこと ～8つのポイント～」(厚生労働省HP)

- ・ 漁業者は、乗組員に対し、次に掲げる感染予防策を要請します。

①・② (略)

③ 以下の場合には漁業者に連絡の上保健所に問い合わせ

ア 体温 37.5 度以上の熱が 4 日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)

イ 強いだるさや息苦しさがある場合

ウ 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが 2 日程度続く場合

- ・ また、漁業者は、例えば産地市場など常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には 2メートルを目安として適切な距離を保って取引を行うことを徹底するなど、感染予防策を行ってください。

マスクの確保については、供給が十分でない状況ですが、政府として取り組んでいるところであり、御理解をいただきますようお願いいたします。

(新設)

(略)

(削除)

- ・ 漁業者及び関係団体は、新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（令和2年5月4日）（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）を参考に、業種別のガイドラインを作成するなど自主的な感染防止のための取組を進めるようお願いします。

2. 出航前及び航海中の対応

- (1) (略)
- (2) 出航前の健康確認
 - ① (略)
 - ② 乗組員本人やその同居家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には、当該乗組員の乗船を見合わせ自宅待機としてください。

その上で、少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに保健所に相談させ、その結果について報告を受けてください。

ア 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

イ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

（※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方）

ウ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合

症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

(略)

【参考】これまで集団感染が確認された場に共通すること

- ① 換気の悪い密閉空間であった
- ② 多くの人が密集していた
- ③ 近距離（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声が行われたという3つの条件が同時に重なった場（「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）（3月9日））

(新設)

2. 出航前及び航海中の対応

- (1) (略)
- (2) 出航前の健康確認
 - ① (略)
 - ② 乗組員本人やその同居家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には、当該乗組員の乗船を見合わせ自宅待機としてください。

その上で、以下の症状に該当する場合には、保健所に相談させ、その結果について報告を受けてください。

ア 体温 37.5 度以上の熱が 4 日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む）

イ 強いだるさや息苦しさがある場合

ウ 基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、体温 37.5 度以上の熱、強いだるさや息苦しさが 2 日程度続く場合

エ 妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。

オ 小児については、小児科による診察が望ましく、かかりつけ小児医療機関等に電話などでご相談ください。

③ (略)

(3) 航海中の対応

① 我が国周辺海域で操業している漁船の場合

ア、イ (略)

ウ 少なくとも以下のいずれかに該当する乗組員が確認された場合には、すぐに船籍港又は最寄りの港の周辺の保健所に相談し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針（搬送先や搬送方法等）及び他の乗組員への感染を防止するための措置について指示を受けてください。

- ・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- ・ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

- ・ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。
- ・ 妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。

エ、オ (略)

② (略)

3. 新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1) (略)

(2) 濃厚接触者の確定
(略)

③ (略)

(3) 航海中の対応

① 我が国周辺海域で操業している漁船の場合

ア、イ (略)

ウ 以下の症状に該当する乗組員が確認された場合は、船籍港又は最寄りの港の周辺の保健所に相談し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針（搬送先や搬送方法等）及び他の乗組員への感染を防止するための措置について指示を受けてください。

- ・ 体温 37.5 度以上の熱が 4 日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む）
- ・ 強いだるさや息苦しさがある場合
- ・ 基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、体温 37.5 度以上の熱、強いだるさや息苦しさが 2 日程度続く場合

エ、オ (略)

② (略)

3. 新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1) (略)

(2) 濃厚接触者の確定
(略)

- ・ 地方自治体は、「厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行う」とされていることに留意が必要です³。

(3) 濃厚接触者への対応

- ①、② (略)
- ③ (略)

【参考】

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。（「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領（暫定版）（国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年 4月20日 版）」）

- ・ 患者（確定例） と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
- ・ 適切な感染防護無しに 患者（確定例） を診察、看護若しくは介護していた者
- ・ 患者（確定例） の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- ・ その他：手で触れること の出来る距離（目安として1メートル） で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と 15分以上の 接触があった者（周辺の環境や接触状況等個々の状況 から患者の感染性を総合的に判断する）

(4) (略)

4. 船内及び設備等の洗浄の実施

① (略)

- ② 消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域（船室、食堂、操舵室、機関室、厨房、倉庫、事務室等）のうち、手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり等）を中心に、アルコール （エタノール又はイソプロパノール）（70%）（アルコール（エタノール又はイソプロパノール）（70%）が入手できない場合には、エタノール（60%台） 又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05%以上）で拭き取り等を実施してください 2・5・6。

(新設)

(3) 濃厚接触者への対応

- ①、② (略)
- ③ (略)

【参考】

「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。（「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領（暫定版）（国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年 3月12日 版）」）

- ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者 と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者
- ・ 適切な感染防護無しに 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者 を診察、看護若しくは介護していた者
- ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者 の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- ・ その他：手で触れること 又は対面で会話することが可能な距離（目安として2メートル） で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と接触があった者（患者の症状など から患者の感染性を総合的に判断する）

(4) (略)

4. 船内及び設備等の洗浄の実施

① (略)

- ② 消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域（船室、食堂、操舵室、機関室、厨房、倉庫、事務室等）のうち、手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり等）を中心に、アルコール （消毒用エタノール（70%）） 又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05%以上）で拭き取り等を実施してください 3・4。

③ (略)

5. 業務の継続

(略)

(略)

(参考)

- 1 新型コロナウイルスに関するQ&A（関連業種の方向け）（令和2年4月15日時点版）（厚生労働省）
- 2 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（改訂2020年4月27日）（国立感染症研究所 国立国際医療研究センター国際感染症センター）
- 3 新型コロナウイルス感染症対策の基本 的対処 方針（令和2年3月28日（令和2年5月4日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定）
- 4 新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（令和2年5月4日）（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）
- 5 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」（厚生労働省健康局結果感染症課）
- 6 「MERS 感染予防のための暫定的ガイドンス（2015年6月25日版）」一般社団法人日本環境感染学会）

③ (略)

5. 業務の継続

(略)

(略)

(参考)

- 1 新型コロナウイルスに関するQ&A（関連業種の方向け）（厚生労働省）
(新設)
- 2 新型コロナウイルス感染症対策の 基本方針（令和2年 2月25日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定）
(新設)
- 3 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」（厚生労働省健康局結果感染症課）
- 4 「MERS 感染予防のための暫定的ガイドンス（2015年6月25日版）」一般社団法人日本環境感染学会）